

Sehr geehrte Patientin! Sehr geehrter Patient!

Es bestehen immer wieder Unklarheiten bezüglich der Urinabgabe zur bestmöglichen Untersuchung.

Daher bitten wie Sie, folgende Punkte bei der Abgabe zu beachten:

Bei den meisten Fragestellungen benötigen wir für die Untersuchung Mittelstrahlurin. Dieser wird nach einer vorsichtigen Reinigung des äußeren Genitale gewonnen, indem Sie erst in die Toilette urinieren, den Strahl kurz unterbrechen und den folgenden Urin in den Becher geben (dieser muß nicht voll sein).

Sollten Sie die Probe zu Hause gewinnen wollen, können Sie entweder von uns oder aus der Apotheke sterile Gefäße bekommen. Bitte sehen Sie davon ab, Ihre Probe in anderen Gefäßen (z.B. Gläsern, Flaschen etc.) abzugeben.

Sollte bei Ihnen der Verdacht auf eine sexuell übertragbare Krankheit/Harnröhrentzündung bestehen, wird die erste Urinportion benötigt mindestens 3 Stunden nach dem letzten Wasserlassen.

Es ist sinnvoll, vor der Einnahme von Antibiotika eine Urinkultur anzusetzen, um den Erreger und auch das richtige Antibiotikum bestimmen zu können. Sollten Sie das Gefühl haben, eine Blasenentzündung zu haben/zu bekommen, können Sie während der Sprechzeiten jederzeit kurzfristig eine Probe abgeben, damit Sie die bestmögliche Therapie erhalten.